

Instruks om anafylaksi

Instruks om anafylaksi

Symptomer

- **Forstadier:** Utilpashed, svimmelhed, båndfornemmelse om hovedet, gråbleg ansigtskulør, blåfarvning af læber og negle, koldsved, hjertebanken, kløe og synkebesvær.
- **Luftveje:** Snue, nysen, hoste, hæshed, pibende og hvæsende vejrtrækning.
- **Kredsløb:** Lavt blodtryk, sved, blegthed, kollaps.
- **Mave-tarm-kanal:** Kvalme, opkastning, koliksmærter, afføringstrang, tissetrang, afgang af afføring og urin.
- **CNS:** Bevidsthedstab, hovedpine, kramper.
- **Huden:** Rødme, nældefeber, hævelse af hals og ansigt.

Praktiske forhold

- Kald højt efter hjælp og bliv ved personen
- Alarmer – RING 112
- Ambulancen guides ind
- Registrer tid under behandling

Behandling af anafylaktisk chok voksne og børn med vægt ≥ 25 kg

1. Administrér epipen 0,3 mg intramuskulært så hurtigt som muligt efter symptomdebut. Epipen forefindes i tasken.
2. Hvis muligt: Giv ilt på maske, 10-12 l/min. Symptomer behandles herefter fra en vurdering fra den autoriserede sundhedsfaglige medarbejder.

Behandling af anafylaktisk chok børn med vægt < 25 kg

1. Administrer epipen 0,15 mg intramuskulært så hurtigt som muligt efter symptomdebut. Epipen forefindes i behandlerrummet.
2. Giv ilt på maske, 10-12 l/min. Symptomer behandles herefter efter en vurdering fra den autoriserede sundhedsfaglige medarbejder.