

Allergisk shock - adrenalin

Instruks gældende for sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter i Pleje og Omsorg i Skive Kommune.

Åben alle

- Formål med instruks om allergisk shock

- At personalet er i stand til at handle ved akut allergisk shock, som er opstået i tilslutning til indgift af et lægemiddel

- Definition af allergisk shock

- En voldsom allergisk reaktion på f.eks. medicin, fødevarer eller dyre/insektgift.
- Er livstruende og tilstanden skal behandles med det samme.
- Den voldsomme reaktion sker ved, at stoffet man reagerer mod, bindes til og ødelægger en type celler i kroppen. De ødelagte celler frigiver en række stoffer, som kan få luftvejene til at trække sig sammen og blodkarrene til at slappe af, hvorved blodtrykket falder markant - deraf navnet shock.
- Hvert år er der ca. 150 anfald i Danmark.

+ Symptomer ved allergisk shock

Lette symptomer:

- Hudreaktioner (rødme, kløe) prikken og snurren i læber og ekstremiteter, varmek fornemmelser
- Ødemer, kløe i mund og svælg, slaphedsfornemmelse og evt. angst/uro, trykken for brystet

Svære symptomer:

- Cyanose og åndedrætsbesvær,



- Svimmelhed og bevidsthedssløring -> kan udvikle sig til en akut tilstand med faldende blodtryk, udsættende respiration og puls.

- Procedure ved allergisk shock

Ved svær, akut allergisk shock

- Tilkald hjælp - ring 112
- Lejring - Læg patienten fladt evt. med løftede ben. Hvis vejtrækningen er besværet evt. siddende.
- Adrenalin i.m. straks – masser injektionsstedet (for hurtigere optagelse)
- Adrenalin 1 mg/ml i følgende dosering: (Se evt. instruks for im injektion)
 - Voksne og børn > 25 kg: 0.3 mg i.m
 - Børn < 25 kg: 0,15 mg i.m
- Ved manglende bedring eller symptomforværring kan ny dosis gives efter 5 minutter.

- Opbevaring af:

I bokse eller poser pakkes:

- 3 stk 1 ml sprøjter
- 3 stk im kanyler
- 3 stk optrækskanyler
- 2 ampuller adrenalin á 1 mg/ml (OBS når ampuller tages ud af æske at mærkes de med Udløbsdato.
- 3 stk spritswaps

Opbevaringssted besluttet lokalt i hvert område.

Holdbarhed adrenalin:

- Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys indtil udløbsdato
- Kan opbevares højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys efter udlevering fra apotek. Skal herefter kasseres.

+ Bestilling af:

- Besluttet lokalt hvem der er ansvarlig for bestilling af adrenalin

Dokumentation:

- Giver der adrenalin dokumenteres det i et observationsnotat

+ Ansvar:

Ledelsen

- Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

- Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
- Udviser omhu og samvittighedsfuldhed.
- Ansvarlig for at frasi sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt

+ Referencer - mere information

→ Sundhed.dk – Allergisk shock (2021)

- Pro medicin -anafylaktisk shock

+ Udarbejdelse af instruks og revision

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Juni 2021

Næste revisionsdato: Juni 2024

Udarbejdet af:

- Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
- Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Sidst opdateret

06.01.2022

Ansvarlig redaktør

LENA

Dorte Pedersen

Sygeplejerske i det sygeplejefaglige udviklingsteam

Udvikling & Administration

✉ DOPE@skivekommune.dk

☎ [41531250](tel:41531250)

Asta Flodgaard

Sygeplejerske i det sygeplejefaglige udviklingsteam

Udvikling & Administration

✉ astf@skivekommune.dk

☎ [21298829](tel:21298829)